

Où faire un test de dépistage ?

En cas d'exposition (AES), rendez-vous le plus rapidement au Service de Soins Le Trait d'Union ou aux Urgences de l'Hôpital le plus proche.

Venez avec votre partenaire !
Parce que vous êtes deux à être exposés au risque...

Centre de Dépistage des IST et du Sida - Strasbourg

3 rue de Sarrelouis
67000 Strasbourg
Tel: 03.68.33.87.60

CHU de Strasbourg - Nouvel Hôpital Civil - Strasbourg

Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite (CDAG)
1, place de l'Hôpital
67000 Strasbourg
Tel: 03.69.55.04.12

SUMPS - Strasbourg

Service Universitaire de Médecine Préventive
6 rue de Palerme
67000 Strasbourg
Tel: 03.68.85.50.25

Service de Soins Le Trait d'Union - Nouvel Hôpital Civil - Strasbourg

1, place de l'Hôpital
67000 Strasbourg
Tel : 03.69.55.05.01

Association AIDES (TROD)*

21 rue de la 1ère Armée
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.75.73.63

Médecins Du Monde (TROD)

24 rue du Maréchal Foch
6700 Strasbourg
Tel : 03.88.14.01.00

La STATION (TROD)

Centre LGBTI Strasbourg/Alsace
7 rue des écrivains
67000 Strasbourg
Tél : 09.50.51.13.29

*TROD = Test Rapide à Orientation Diagnostique

Pour toute information :

COREVIH

03 88 11 53 68 - 03 88 11 65 64

AIDES Alsace

03 88 75 73 63 - 03 89 45 54 46

En France : www.sida-info service.org

SIDA Info Service : 0800 840 800

Appel anonyme et gratuit 24/24

www.sante.gouv.fr

Rubrique « les dossiers » sélectionner Sida



COREVIH Alsace

Hôpital Civil de Strasbourg
Ancien Bâtiment d'ophtalmologie
1, Place de l'Hôpital - B.P. 426
67091 Strasbourg Cedex
FRANCE

www.corevih-alsace.fr



SIDA

Le dépistage, dès qu'il y a un doute...

C'est quoi

un test de dépistage ?

Une simple prise de sang permet de détecter la présence du virus du SIDA (VIH) dans l'organisme. C'est une démarche libre et volontaire

On peut le faire :

- ▶ Dans une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) ou dans un Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) : consultation et test gratuits pour tous et anonymes (aucun papier à présenter) ;
- ▶ Dans certains centres de planification et d'éducation familiale : consultation et test gratuits ;
- ▶ Dans un laboratoire d'analyses médicales :
 - Remboursement du test à 100% sur prescription médicale
 - A votre charge sans prescription médicale

SIDA : Syndrome de l'Immunodéficience Acquise
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
CDAG : Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit
CIDDIST : Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles

Quand

faire un test de dépistage ?

Si vous avez pris un risque :

Sexuel :

- ▶ Vous avez eu un rapport sexuel sans préservatif avec une personne dont vous ne savez pas si elle est séropositive.
- ▶ Le préservatif s'est déchiré ou a glissé durant le rapport sexuel.

Sanguin :

- ▶ Vous avez partagé le matériel (seringue, coton, paille, cuiller) lors d'un usage de drogue.
- ▶ Vous avez un doute sur le matériel utilisé lors d'un piercing, tatouage, scarification ...
- ▶ Vous avez eu un contact sanguin accidentel avec une autre personne.

La contamination n'est pas systématique mais il suffit d'avoir pris l'un de ces risques une fois pour être contaminé. Alors n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Si vous souhaitez abandonner le préservatif :

- ▶ Vous vivez une relation stable et vous ne souhaitez plus utiliser de préservatif dans votre couple.

Pourquoi

faire un test de dépistage ?

- ▶ Vous avez peut-être pris des risques dans le passé, vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à l'infection à VIH. Connaître le résultat de son test permet d'adapter son comportement
- ▶ Pour pouvoir bénéficier le plus tôt possible d'un suivi médical.

On ne guérit pas encore du sida mais il existe des médicaments efficaces qui permettent de lutter contre l'évolution de l'infection.

Le résultat du test n'est valable que pour soi-même.
Chaque partenaire doit faire son propre test, il est à refaire pour chaque prise de risque.

Que faire ?

Votre meilleur conseiller est votre médecin traitant, votre gynécologue, un médecin de CDAG ou de centre de planification. Il pourra évaluer votre prise de risque et vous guider dans la démarche la mieux adaptée.

Un test de dépistage vous sera proposé si nécessaire.

Séropositif(ve) = contaminé(e) par le VIH
On peut être séropositif sans avoir de signe de maladie.

Si vous avez pris un risque :

Rendez-vous le plus rapidement possible, avec un votre partenaire si vous le pouvez, aux urgences d'un hôpital. Le médecin évaluera le risque et si nécessaire pourra vous prescrire un traitement d'urgence.

Dépistage, mode d'emploi